



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA – CFT**

**Parecer Técnico nº 1**

**Reavaliação dos medicamentos do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica para construção da Relação Estadual de Medicamentos (REME-RS) Lovastatina**

Atualmente, todos os medicamentos incorporados pelo Ministério da Saúde (MS) no Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) são disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS). Porém, verifica-se a necessidade de revisão deste elenco, com base no perfil e nas necessidades da população do Estado, visando maior racionalidade e eficiência administrativa, com o objetivo de aumentar o acesso aos medicamentos essenciais. A própria normatização do CEAF permite que o ente federativo responsável faça a seleção dos medicamentos que serão ofertados, desde que não haja prejuízo na linha de cuidado da situação clínica em questão, definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.


A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da SES/RS elaborou um método técnico-científico de avaliação deste elenco, baseado nas linhas de cuidado dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do MS, com o intuito de construir a Relação Estadual de Medicamentos (REME-RS) com os medicamentos considerados essenciais no Estado do Rio Grande do Sul.

A partir deste método, medicamentos de um mesmo grupo de financiamento do CEAF e que não possuem especificidades técnicas que o tornam indispensáveis dentro de cada linha de cuidado do PCDT são comparados às possíveis alternativas terapêuticas de mesma classe farmacológica e via de administração. Leva-se em consideração também o histórico da demanda do medicamento na SES/RS, a possibilidade atual de compra e seu custo comparado às alternativas terapêuticas. O fluxo de avaliação destes dados conta no Anexo 1 deste documento.

Após o preenchimento das etapas citadas acima, concluiu-se que o medicamento abaixo deve ser avaliado pela CFT em relação à sua manutenção na REME, conforme descrito a seguir:

Medicamento	Lovastatina 10mg (por comprimido) Lovastatina 20mg (por comprimido) Lovastatina 40mg (por comprimido)
Linha de cuidado	Dislipidemia para a prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
CID-10 contemplados	E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipergliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomicronemia E784 Outras hiperlipidemias E785 Hiperlipidemia não especificada

	E786 Deficiências de lipoproteínas E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas																														
Mesma classe farmacológica na linha de cuidado	Medicamentos de mesma classe farmacológica dentro da linha de cuidado:  Grupo 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atorvastatina cálcica (comprimidos de 10mg; 20mg; 40mg; e 80mg)</li> <li>• Fluvastatina (cápsulas de 20mg e 40mg)</li> <li>• Lovastatina (cápsulas de 10mg, 20mg e 40mg)</li> <li>• Pravastatina sódica (comprimidos de 10mg; 20mg; e 40mg)</li> </ul> Grupo 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinvastatina (comprimidos de 10mg; 20mg; e 40mg)</li> </ul>																														
Especificidades PCDT	A dose inicial preconizada no PCDT é 20 mg/dia, com dose máxima de 80mg/dia.  Conforme o PCDT de dislipidemia, a lovastatina apresenta benefício no que diz respeito a prevenção de infarto do miocárdio, revascularização, angina e desfecho combinado de infarto, angina e mortalidade cardiovascular.  Segundo o PCDT, a lovastatina, assim como sinvastatina, pravastatina, fluvastatina e atorvastatina, são representantes da classe das estatinas contempladas na linha de cuidado que apresentam evidência inequívoca de benefício em desfechos primordiais tanto em homens quanto em mulheres. No entanto, faltam estudos comparando diretamente os produtos ( <i>head-to-head comparison</i> ) em prevenção primária. Dados de prevenção secundária comparam somente o benefício de atorvastatina com pravastatina.  Assim, o PCDT não recomenda o uso de uma estatina em detrimento de outra - com exceção da pravastatina, que é escolhida no caso de pacientes que utilizam medicamentos antiretrovirais.																														
Alternativas terapêuticas	As alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, para a mesma indicação de tratamento da lovastatina, da mesma classe farmacológica e via de administração, pertencentes ao mesmo grupo de financiamento do CEAF, são ATORVASTATINA e FLUVASTATINA.																														
Demanda na linha de cuidado – alternativas terapêuticas	A demanda atual (número de pacientes) da lovastatina e suas alternativas terapêuticas, com suas respectivas concentrações, segue abaixo:  Tabela 1: Demanda atual dos medicamentos (número de pacientes) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ADMINISTRATIVO</th> <th>JUDICIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atorvastatina 10 mg (por comprimido)</td> <td>397</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Atorvastatina 20 mg (por comprimido)</td> <td>1057</td> <td>223</td> </tr> <tr> <td>Atorvastatina 40 mg (por comprimido)</td> <td>1394</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Atorvastatina 80 mg (por comprimido)</td> <td>653</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>Fluvastatina 20 mg (por cápsula)</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fluvastatina 40 mg (por cápsula)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Lovastatina 10 mg (por comprimido)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Lovastatina 20 mg (por comprimido)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Lovastatina 40 mg (por comprimido)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		ADMINISTRATIVO	JUDICIAL	Atorvastatina 10 mg (por comprimido)	397	115	Atorvastatina 20 mg (por comprimido)	1057	223	Atorvastatina 40 mg (por comprimido)	1394	300	Atorvastatina 80 mg (por comprimido)	653	142	Fluvastatina 20 mg (por cápsula)	1	0	Fluvastatina 40 mg (por cápsula)	0	0	Lovastatina 10 mg (por comprimido)	0	0	Lovastatina 20 mg (por comprimido)	0	0	Lovastatina 40 mg (por comprimido)	0	0
	ADMINISTRATIVO	JUDICIAL																													
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)	397	115																													
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)	1057	223																													
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)	1394	300																													
Atorvastatina 80 mg (por comprimido)	653	142																													
Fluvastatina 20 mg (por cápsula)	1	0																													
Fluvastatina 40 mg (por cápsula)	0	0																													
Lovastatina 10 mg (por comprimido)	0	0																													
Lovastatina 20 mg (por comprimido)	0	0																													
Lovastatina 40 mg (por comprimido)	0	0																													
Demanda em outras linhas de cuidado	Este medicamento não está presente em outras linhas de cuidado.																														
Histórico de demanda de anos anteriores	Conforme relatório emitido em 10/07/2.020 pelo sistema AME (solicitado à PROCERGS), a última demanda deste medicamento foi em 09/2018.																														
Situação de	Neste momento a SES não possui ata de registro de preço e rotina de aquisição deste																														


compra atual	medicamento.																																																												
Custo	<p>O custo atual para compra da lovastatina e das suas alternativas terapêuticas, com suas respectivas concentrações, segue abaixo:</p> <p><b>Tabela 2: Valores dos medicamentos</b></p> <table border="1" data-bbox="363 389 1465 965"> <thead> <tr> <th></th> <th>Valor unitário SES/RS (última ARP)</th> <th>Valor unitário BPS</th> <th>Valor unitário PMVG-CMED ICMS 0% (menor valor)</th> <th>Custo tratamento/mês* (posologia mínima**)</th> <th>Custo tratamento/mês* (posologia máxima***)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atorvastatina 10 mg (por comprimido)</td> <td>R\$ 0,20</td> <td>R\$ 0,19</td> <td>R\$ 1,16</td> <td>R\$ 34,80</td> <td>R\$ 278,40</td> </tr> <tr> <td>Atorvastatina 20 mg (por comprimido)</td> <td>R\$ 0,28</td> <td>R\$ 0,20</td> <td>R\$ 1,13</td> <td>R\$ 33,80</td> <td>R\$ 135,20</td> </tr> <tr> <td>Atorvastatina 40 mg (por comprimido)</td> <td>R\$ 0,50</td> <td>R\$ 0,47</td> <td>R\$ 2,06</td> <td>R\$ 61,80</td> <td>R\$ 123,60</td> </tr> <tr> <td>Atorvastatina 80 mg (por comprimido)</td> <td>R\$ 1,15</td> <td>R\$ 1,06</td> <td>R\$ 2,32</td> <td>R\$ 69,60</td> <td>R\$ 69,60</td> </tr> <tr> <td>Fluvastatina 20 mg (por comprimido)</td> <td>n/a</td> <td>Não consta</td> <td>Não consta</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> </tr> <tr> <td>Fluvastatina 40 mg (por comprimido)</td> <td>n/a</td> <td>Não consta</td> <td>Não consta</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> </tr> <tr> <td>Lovastatina 10 mg (por comprimido)</td> <td>n/a</td> <td>Não consta</td> <td>Não consta</td> <td>n/a</td> <td>n/a</td> </tr> <tr> <td>Lovastatina 20 mg (por comprimido)</td> <td>n/a</td> <td>Não consta</td> <td>R\$ 1,34</td> <td>R\$ 40,20</td> <td>R\$ 160,80</td> </tr> <tr> <td>Lovastatina 40 mg (por comprimido)</td> <td>n/a</td> <td>Não consta</td> <td>R\$ 2,44</td> <td>R\$ 73,20</td> <td>R\$ 146,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Legenda: ARP = Ata de Registro de Preços; BPS = Banco de Preços em Saúde; PMVG-CMED = Preço Máximo de Venda ao Governo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos; ICMS = Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.</p> <p>*Valores calculados pelo Valor unitário do PMVG-CMED</p> <p>** Posologia mínima, conforme PCDT: atorvastatina 10mg; lovastatina 20mg. Demais concentrações: calculada a posologia de 1 comprimido ao dia de cada concentração.</p> <p>***Posologia máxima, conforme PCDT: atorvastatina 80mg; lovastatina 80mg. Demais concentrações: calculada a posologia até alcançar a dose máxima.</p> <p><b>Gráfico 1: Comparação entre o custo mínimo e máximo das alternativas terapêuticas</b></p> 		Valor unitário SES/RS (última ARP)	Valor unitário BPS	Valor unitário PMVG-CMED ICMS 0% (menor valor)	Custo tratamento/mês* (posologia mínima**)	Custo tratamento/mês* (posologia máxima***)	Atorvastatina 10 mg (por comprimido)	R\$ 0,20	R\$ 0,19	R\$ 1,16	R\$ 34,80	R\$ 278,40	Atorvastatina 20 mg (por comprimido)	R\$ 0,28	R\$ 0,20	R\$ 1,13	R\$ 33,80	R\$ 135,20	Atorvastatina 40 mg (por comprimido)	R\$ 0,50	R\$ 0,47	R\$ 2,06	R\$ 61,80	R\$ 123,60	Atorvastatina 80 mg (por comprimido)	R\$ 1,15	R\$ 1,06	R\$ 2,32	R\$ 69,60	R\$ 69,60	Fluvastatina 20 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	Não consta	n/a	n/a	Fluvastatina 40 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	Não consta	n/a	n/a	Lovastatina 10 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	Não consta	n/a	n/a	Lovastatina 20 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	R\$ 1,34	R\$ 40,20	R\$ 160,80	Lovastatina 40 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	R\$ 2,44	R\$ 73,20	R\$ 146,40
	Valor unitário SES/RS (última ARP)	Valor unitário BPS	Valor unitário PMVG-CMED ICMS 0% (menor valor)	Custo tratamento/mês* (posologia mínima**)	Custo tratamento/mês* (posologia máxima***)																																																								
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)	R\$ 0,20	R\$ 0,19	R\$ 1,16	R\$ 34,80	R\$ 278,40																																																								
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)	R\$ 0,28	R\$ 0,20	R\$ 1,13	R\$ 33,80	R\$ 135,20																																																								
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)	R\$ 0,50	R\$ 0,47	R\$ 2,06	R\$ 61,80	R\$ 123,60																																																								
Atorvastatina 80 mg (por comprimido)	R\$ 1,15	R\$ 1,06	R\$ 2,32	R\$ 69,60	R\$ 69,60																																																								
Fluvastatina 20 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	Não consta	n/a	n/a																																																								
Fluvastatina 40 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	Não consta	n/a	n/a																																																								
Lovastatina 10 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	Não consta	n/a	n/a																																																								
Lovastatina 20 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	R\$ 1,34	R\$ 40,20	R\$ 160,80																																																								
Lovastatina 40 mg (por comprimido)	n/a	Não consta	R\$ 2,44	R\$ 73,20	R\$ 146,40																																																								
Discussão	<p>Conforme PCDT, não há diferença entre as alternativas terapêuticas em relação à eficácia e segurança. Ainda, não há nenhuma especificidade que justifique a obrigatoriedade da lovastatina dentro da linha de cuidado da dislipidemia.</p> <p>Não há demanda do medicamento Lovastatina em nenhuma das concentrações disponíveis.</p> <p>A Lovastatina na concentração 10mg não consta na lista CMED.</p> <p>Avaliando as alternativas terapêuticas, a atorvastatina possui maior demanda em todas as concentrações apresentadas quando comparada à lovastatina.</p>																																																												

	<p>Em relação aos custos, o valor do tratamento com lovastatina não representa um benefício de custo relevante para considerar mantê-lo ou substituí-lo pela atorvastatina.</p> <p>Com objetivo de racionalizar o uso de medicamentos e otimizar o processo de compra, considera-se não incluir na REME a lovastatina, nas concentrações 10mg, 20mg e 40mg.</p>
Recomendação	<p>Diante do exposto, os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica da SES/RS, em reunião realizada no dia 21 de setembro de 2020, deliberaram recomendar a <b>exclusão da lovastatina nas apresentações 10mg por comprimido, 20mg por comprimido e 40mg por comprimido</b> como opção terapêutica de Dislipidemia para a prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite no Sistema Único de Saúde no âmbito da SES/RS.</p>
Referências	<p>1. Ministério da Saúde (BR). Portaria Conjunta nº8, de 30 de julho de 2019. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite. Diário Oficial da União. 7 ago 2019; Seção 1:75.</p>

Porto Alegre, setembro de 2.020.

ANEXO 1

Fluxograma do método de avaliação dos medicamentos



# ANEXO 2

## Tabela de avaliação da linha de cuidado

Situação Clínica	CID-10 conforme PCDT	Classe farmacológica	Medicamentos	Grupo CEAF	Especificidades conforme PCDT	Alternativas Terapêuticas	Nº pacientes		Análise das apresentações			Análise Potencial de Exclusão			
									Quantos % de demanda ADM (este medicamento representa dentre as alternativas terapêuticas)	Medicamento é adquirido pela SES atualmente?	Medicamento está na cmed?	Possui outras indicações? Se sim, para quais e quantos pacientes estão utilizando?	Apto a elaborar parecer?		
							ADM	JUD							
Dislipidemia para a prevenção de eventos cardiovasculares e pancreáticos (Parâmetro C/Anexo SAS-SCT/MS Nº 8, de 30/07/2019)	E70.0 Hipocolesterolia E70.1 HD lipoproteínas para a prevenção de eventos cardiovasculares e pancreáticos E70.2 HD lipoproteínas mista E70.3 HD lipoproteínas ricas em lipoproteínas E70.4 Outras HD lipoproteínas E70.5 HD lipoproteína não especificada E70.6 Distúrbios de lipoproteínas E70.8 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	Inibidores da HMG-CoA redutase (estatinas)	Atorvastatina 10 mg (per comprimido)	2	Dose inicial recomendada: 10 mg (e a dose usual)	A. Gemfibrozil B. Fenofibrato, ciprofibrato, etofibrato ou bezafibrato	397	11,5	11,24	Sim	Sim	Não	Mantém na REME		
			Atorvastatina 20 mg (per comprimido)	2	não		1487	22,1	20,38	Sim	Sim	Sim, HIV	Não	Mantém na REME	
			Atorvastatina 40 mg (per comprimido)	2	não		1.298	20,0	39,01	Sim	Sim	Não	Não	Mantém na REME	
			Atorvastatina 80 mg (per comprimido)	2	em prevenção secundária, altas doses de atorvastatina (80 mg/dia) foram superiores a doses usuais de atorvastatina (40 mg/dia) e de simvastatina (10 mg/dia); atorvastatina (80 mg/dia) mostrou mais benefícios em pacientes pós-IAM, comparada à atorvastatina (20 mg/dia), incluindo eventos cardiovasculares maiores, sem alterar a mortalidade total	D. Atorvastatina, Fluvastatina, Lovastatina E. Simvastatina F. Pravastatina	653	14,2	19,65	Sim	Sim	Não	Não	Sim	
			Fluvastatina 20 mg (per cápsula)	2	Dose inicial recomendada: 20 mg		1	0	0,01	Não	Não	Não	Não	Sim	
			Fluvastatina 40 mg (per cápsula)	2	não		0	0	0,01	Não	Não	Não	Não	Sim	
			Fluvastatina 10 mg (per comprimido)	2	benefício no que diz respeito à prevenção de infarto do miocárdio, aterocclatose, angina e de eventos combinados de infarto, angina e morte liderada por vascular		0	0	0,01	Não	Não	Não	Não	Sim	
			Fluvastatina 20 mg (per comprimido)	2	benefício no que diz respeito à prevenção de infarto do miocárdio, aterocclatose, angina e de eventos combinados de infarto, angina e morte liderada por vascular; Dose inicial recomendada: 20 mg		0	0	0,01	Não	Sim	Não	Não	Sim	
			Fluvastatina 40 mg (per comprimido)	2	benefício no que diz respeito à prevenção de infarto do miocárdio, aterocclatose, angina e de eventos combinados de infarto, angina e morte liderada por vascular		0	0	0,01	Não	Sim	Não	Não	Sim	
			Pravastatina 10 mg (per comprimido)	2	Apesar da ausência de evidências clínicas contundentes de interação das estatinas que interferem no eixo renal PNI com medicamentos antidiabéticos, alguns diabetes recomendam o emprego preferencial de pravastatina na atorvastatina por não interferirem nesta rota metabólica. Assim, a pravastatina, por ser a alternativa preferencial de menor custo, é a estatina de escolha para estes pacientes. Melhorar e mais contundentes evidências no que se refere à prevenção de mortalidade (assim como atorvastatina)		5	0	12,20	Não (faltação devida)	Sim	Não	Não	Sim	
			Pravastatina 20 mg (per comprimido)	2	Apesar da ausência de evidências clínicas contundentes de interação das estatinas que interferem no eixo renal PNI com medicamentos antidiabéticos, alguns diabetes recomendam o emprego preferencial de pravastatina na atorvastatina por não interferirem nesta rota metabólica. Assim, a pravastatina, por ser a alternativa preferencial de menor custo, é a estatina de escolha para estes pacientes. Melhorar e mais contundentes evidências no que se refere à prevenção de mortalidade (assim como atorvastatina)		28	20	85,27	Não (faltação devida)	Sim	Sim, HIV	Não	Mantém na REME	
			Pravastatina 40 mg (per comprimido)	2	Apesar da ausência de evidências clínicas contundentes de interação das estatinas que interferem no eixo renal PNI com medicamentos antidiabéticos, alguns diabetes recomendam o emprego preferencial de pravastatina na atorvastatina por não interferirem nesta rota metabólica. Assim, a pravastatina, por ser a alternativa preferencial de menor custo, é a estatina de escolha para estes pacientes. Melhorar e mais contundentes evidências no que se refere à prevenção de mortalidade (assim como atorvastatina)		1	5	2,44	Não (faltação devida)	Sim	Não	Não	Sim	
			Simvastatina 10 mg (per comprimido)	3	melhorar e mais contundentes evidências no que se refere à prevenção de mortalidade (assim como atorvastatina)		n/a	n/a	n/a	Não	Sim	Não	Não	Mantém na REME	
			Simvastatina 20 mg (per comprimido)	3	melhorar e mais contundentes evidências no que se refere à prevenção de mortalidade (assim como atorvastatina)		n/a	n/a	n/a	Não	Sim	Não	Não	Mantém na REME	
			Simvastatina 40 mg (per comprimido)	3	melhorar e mais contundentes evidências no que se refere à prevenção de mortalidade (assim como atorvastatina)		n/a	n/a	n/a	Não	Sim	Não	Não	Mantém na REME	
			Arterio Níveis e distúrbios	Ácido nicotínico 250 mg (per comprimido de liberação prolongada)	2	pacientes insulinoresistentes e diabéticos que não permitem exatidão no uso de fibratos. Devido à baixa solubilidade intrínseca a doses elevadas, inicia-se o tratamento com doses baixas (250 mg em dose única após o jantar)		1	0	20,01	Não	Não	Não	Não	Sim
				Ácido nicotínico 500 mg (per comprimido de liberação prolongada)	2	pacientes insulinoresistentes e diabéticos que não permitem exatidão no uso de fibratos		4	3	81,01	Não (faltação devida)	Sim	Não	Não	Sim
				Ácido nicotínico 750 mg (per comprimido de liberação prolongada)	2	pacientes insulinoresistentes e diabéticos que não permitem exatidão no uso de fibratos		0	0	0,01	Não	Sim	Não	Não	Sim
			Fibratos	Berapíron 210 mg (per cápsula ou comprimido)	2	pacientes sem indicação de uso de estatinas e com triglicéridos acima de 500 mg/dL (p/pretensão prevenção de pancreatite); Dose inicial recomendada: 210 mg		122	17	3,65	Sim	Sim	Não	Não	Sim
				Berapíron 420 mg (per comprimido de dose única diária)	2	pacientes sem indicação de uso de estatinas e com triglicéridos acima de 500 mg/dL (p/pretensão prevenção de pancreatite)		15	4	11,45	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Ciprofibrato 100 mg (per comprimido)	2	pacientes sem indicação de uso de estatinas e com triglicéridos acima de 500 mg/dL (p/pretensão prevenção de pancreatite)			2495	25,6	81,37	Sim	Sim	Não	Não	Mantém na REME			
Etofibrato 100 mg (per cápsula)	2	pacientes sem indicação de uso de estatinas e com triglicéridos acima de 500 mg/dL (p/pretensão prevenção de pancreatite)			7	7	0,01	Não	Não	Não	Não	Sim			
Fenofibrato 200 mg (per cápsula)	2	pacientes sem indicação de uso de estatinas e com triglicéridos acima de 500 mg/dL (p/pretensão prevenção de pancreatite); em paciente com triglicéridos maiores que 500 mg/dL, com adição à dieta			287	37	8,38	Sim	Sim	Não	Não	Sim			
Fenofibrato 250 mg (per cápsula de liberação retardada)	2	pacientes sem indicação de uso de estatinas e com triglicéridos acima de 500 mg/dL (p/pretensão prevenção de pancreatite); em paciente com triglicéridos maiores que 500 mg/dL, com adição à dieta e exercícios e em uso de estatinas, estas podem ser combinadas com fenofibrato para redução do risco de pancreatite aguda. Dose máxima 250mg			226	64	6,76	Sim	Sim	Não	Não	Sim			
Gemfibrozil 600 mg (per comprimido)	2	não pode ser usada em associação com estatinas pelo risco de miopatia. Individa a pacientes intolerantes ou refratários a estatinas. Dose inicial recomendada: 600 mg			214	26	61,42	Sim	Sim	Sim, HIV	Não	Mantém na REME			
Gemfibrozil 900 mg (per comprimido)	2	não pode ser usada em associação com estatinas pelo risco de miopatia. Individa a pacientes intolerantes ou refratários a estatinas		15	5	3,38	Sim	Sim	Não	Não	Sim				